市場、夜市從業人員需知

- 市場及夜市傳播漢他病毒風險相當高，請務必加強環境衛生清理，消除老鼠生存環境，並持續滅鼠捕鼠工作。
- 市場、夜市環境衛生清理人員及捕滅鼠人員應注意口罩、手套、鞋套防護器具的使用，並於工作完畢後進行自身清潔及消毒，降低感染的風險。

清水10公升
(1250CC. 寶特瓶8瓶)
＋
家用漂白水100CC.
(約5湯匙)

以1：100比例稀釋的家用含氯漂白水可做為消毒水使用。



防鼠三不




- 留意環境中老鼠可能入侵的途徑。
- 住宅、餐廳、市場及夜市等公共場所等，應加強環境清潔工作，驅除鼠類並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。
- 食物、飲水及廚餘等妥善收藏，以免引來老鼠覓食而造成污染。

2013.07修

疫情通報及關懷專線：1922
http://www.cdc.gov.tw

廣告

遠離老鼠 漢他病毒不由牠



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

漢他病毒簡介

什麼是漢他病毒症候群？

由漢他病毒所引起的人畜共通傳染病，依臨床症狀分為兩種：



漢他病毒出血熱(HFRS)

三大臨床表徵

- 發燒
- 血小板減少
- 急性腎衰竭



漢他病毒肺症候群(HPS)

早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象，快速進展至呼吸衰竭與休克。

傳染媒介

傳染媒介

鼠類動物為主要宿主

(臺灣主要為溝鼠及錢鼠)



傳染方式

- 吸入有漢他病毒鼠類分泌物(包括糞、尿、唾液等)之飛沫。
- 接觸遭病毒污染的物體。
- 遭帶病毒之鼠類動物咬傷。
- 很少人傳人。

潛伏期

- 漢他病毒出血熱：12~16天。
- 漢他病毒肺症候群：6天至數週之間，平均約2週。

就醫資訊



當身體出現發燒、出血、急性腎衰竭等症狀，且曾接觸鼠類動物的排泄物或遭其咬傷時，請儘速就醫並主動告知醫師相關動物接觸史等訊息，以及早獲得妥適的治療。



